

Výživové údaje	100 ml pripravenej / pripravenej výživy**
Energetická hodnota / Energia (kJ / kcal)	285 / 68
Tuky (z toho)	3,7 g
- nasycené / nasýtené mastné kyseliny	1,6 g
- mononenasycené / mononenasýtené mastné kyseliny	1,6 g
- polynenasycené / polynenasýtené mastné kyseliny	0,5 g
- z toho kyselina linolová (omega-6 mastná kyselina)	0,41 g
- z toho kyselina alfa-linolenová / linolénová (omega-3 mastná kyselina)	0,06 g
- z toho kyselina dokosahexaenová / dokozahexénová (DHA)	13,6 mg
Sacharidy (z toho)	7,3 g
- cukry	5,6 g
- z toho laktóza	5,6 g
- škrob	1,7 g
Bielkoviny/Bielkoviny	1,4 g
Sodík	20 mg (5 %*)
Draslík	84 mg (8 %*)
Chloridy	52 mg (10 %*)
Vápnik/Vápnik	70 mg (13 %*)
Fosfor	38 mg (7 %*)
Hořčík/Hořčík	6,3 mg (8 %*)
Železo	1,0 mg (13 %*)
Zinek/Zinok	0,5 mg (10 %*)
Měď/Meď	0,054 mg (11 %*)
Jód	15 µg (19 %*)
Selen/Selén	3,9 µg (20 %*)
Mangan/Mangán	0,0075 mg (1 %*)
Fluoridy	< 0,010 mg
Vitámín A	56 µg (14 %*)
Vitámín D	1,6 µg (23 %*)
Vitámín E	0,90 mg (18 %*)
Vitámín K	3,1 µg (26 %*)
Vitámín C	10,0 mg (22 %*)
Vitámín B1	0,037 mg (7 %*)
Vitámín B2	0,12 mg (17 %*)
Niacín/Niacín	0,53 mg (8 %*)
Vitámín B6	0,042 mg (6 %*)
Kyselina listová	10,0 µg (13 %*)
Vitámín B12	0,10 µg (13 %*)
Kyselina pantotenová/pantothénová	0,35 mg (12 %*)
Biotín/Biotín	1,6 µg (16 %*)

\*referenční hodnoty příjmu

\*\*referenčné hodnoty príjmu

Analytické hodnoty podliehajú vykyvum, ktoré jsou obyčké v výrobku z prírodných surovín.

\*\*Standardní ředění: 13,2 g Bebevita 2 + 90 ml převarované pitné vody = 100 ml pripravenej výživy. 1 zarovnaná odměrka = 4,4 g Bebevita 2. / Analytické hodnoty podliehajú vykyvom, ktoré sú bežné pri výrobkoch z prírodných surovín. \*\*Standardné riedenie: 13,2 g Bebevita 2 + 90 ml prevarenej pitnej vody = 100 ml pripravenej výživy. 1 zarovnaná odměrka = 4,4 g Bebevita 2.

**Složení:** odtučnené mléko, rostlinné oleje (palmový, repkový, slunečnicový), laktóza (z mléka), produkt mléčné syrovátky, škrob, LCP nenasycené mastné kyseliny s dlhým reťazcom (rybí olej), uhličitán vápenatý, chlorid draselny, emulgátor lecitin, citrónan sodny, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, draselné soli kyseliny citrónovej, uhličitán hořčnatý, L-tryptofán, L-askorbát sodný (vitamín C), síran železnatý, DL-alpha tokoferol acetát (vitamín E), nikotinamid, oxid zinečnatý, D-pantotenát vápenatý, síran mednatý, retinyl acetát (vitamín A), thiamin hydrochlorid (vitamín B1), riboflavin (vitamín B2), pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6), jodičnan draselny, kyselina listová, síran manganatý, seleničtan sodny, fytomenadión (vitamín K), cholekalciferol (vitamín D), D-biotin. Vztahuje sa k sušenému stavu.

**Zloženie:** odtučnené mléko, rastlinné oleje (palmový, repkový, slnečnicový), laktóza (z mléka), produkt mléčnej syrovátky, škrob, LCP nenasycené mastné kyseliny s dlhým reťazcom (rybí olej), uhličitán vápenatý, chlorid draselny, emulgátor lecitin, citrónan sodny, vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej, draselné soli kyseliny citrónovej, uhličitán hořčnatý, L-tryptofán, L-askorbát sodný (vitamín C), síran železnatý, DL-alpha tokoferol acetát (vitamín E), nikotinamid, oxid zinečnatý, D-pantotenát vápenatý, síran mednatý, retinyl acetát (vitamín A), thiamin hydrochlorid (vitamín B1), riboflavin (vitamín B2), pyridoxin hydrochlorid (vitamín B6), jodičnan draselny, kyselina listová, síran manganatý, seleničtan sodny, fytomenadión (vitamín K), cholekalciferol (vitamín D), D-biotin. Vztahuje sa k sušenému stavu.

**Pokračovací mléčná kojenecká výživa od ukončeného 6. měsíce, 500 g**

**Důležité upozornění:**

...pro výživu Vašeho dítěte - Vylučné kojení je v prvních šesti měsících pro Vaše dítě ideální. Pokračovací mléčná kojenecká výživa není vhodná jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. Pokračovací mléčná kojenecká výživa je určena pro děti od ukončeného 6. měsíce jako součást různorodé stravy. Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla šesti měsíců by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě, v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách konkrétního kojence.

...pro zuby Vašeho dítěte - Stejně jako mateřské mléko, obsahují také kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubů s tekutinou obsahující sacharidy může způsobit vznik zubního kazu a s tím související zdravotní problémy. Krmité proto své dítě plynule, nenechávejte ho z lžáve dlouho pít a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku.

Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.

**Množství nápoje a dávkování**

Množství nápoje na lžávu může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Uvedené množství nápoje a počty lžávi jsou pouze orientační.

**Použijte prosím přiloženou odměrku!**



Množství pripravenej výživy / Množstvo pripravenej výživy	Na jednu dávku potřebujete / Na jednu dávku potrebujete		
	Množství vody / Množstvo vody	Počet odměrek / Počet odmeriek	Množství prášku / Množstvo prášku
135 ml	120 ml	4	17,6 g
170 ml	150 ml	5	22,0 g
200 ml	180 ml	6	26,4 g

Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. S každým nově přidaným příkrmem nebo kaší odpadá jedno jídlo v lžávi.

**Návod k přípravě**

Dodržujte přesně návod na přípravu mléčné kojenecké výživy i uvedené doporučení. Nesprávná příprava nebo uchování by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte, např. nárůstem nežádoucích bakteriálních zrodků. Proto připravujte výživu před každým krmním čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. Lžáva a všechny její součásti vždy pečlivě vymyjte. Otevřený obal ihned po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu při teplotě max. 25°C a zamezte kolísání teplot. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otevření obalu. Neohřívajte výživu v mikrovlnné troubě (bezpečně opatření). Před použitím se prosím přesvědčte, že balení zůstalo neporušené.

1. Pitnou vodu určenou pro kojence před každou přípravou čerstvě převaríme a necháme zchladnout na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. Připravenou vodu nalijeme do lžávy (množství dle tabulky).
3. Odměrkou lehce naplníme výrobkem a opačnou stranou nože zarovnáme. Odměřené množství výrobku přidáme do lžávy.
4. Lžávu uzavřeme a důkladně protřepejeme.
5. Zchladíme na teplotu vhodnou k pití (cca 37°C). Teplotu prověříme.



**Následná mléčná dojčenská výživa od ukončeného 6. mesiaca, 500 g**

**Dôležité upozornenia:**

...pre výživu Vášho dieťaťa - Vylučné dočinenie je v prvých šiestich mesiacoch pre Vaše dieťa ideálne. Následná mléčná dojčenská výživa nie je vhodná ako náhrada materského mlieka počas prvých šiestich mesiacov života. Následná mléčná dojčenská výživa je určená pre deti od ukončeného 6. mesiaca ako súčasť rôznorodej stravy. Rozhodnutie začať podávať príkrmy, vrátane akejkoľvek výnimky z pravidla šiestich mesiacov, by malo byť prijaté len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa, v závislosti od individuálneho rastu a vývojových potrieb konkrétneho dieťaťa.

...pre zuby Vášho dieťaťa - Tak ako materské mlieko, obsahujú aj dojčenské výživy sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy Vášho dieťaťa. Častý alebo trvalý kontakt zubov s tekutinou obsahujúcou sacharidy, môže spôsobiť vznik zubného kazu a s tým súvisiace zdravotné problémy. Krmte preto svoje dieťa bez prerušovania, nenechávajte ho dlho piť z fľaše a naučte ho čo najskôr piť z pohára.

Venujte pozornosť vyváženej strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

**Množstvo nápoja a dávkovanie**

Množstvo nápoja na fľašu môže byť rozdielne na základe individuálnych potrieb. Uvedené množstvo nápoja a počet fľaš na deň sú len orientačné.

**Používajte prosím priloženú odmerku!**

Dojčatá potrebujú cca 5 jedál denne. S každým novo pridaným príkrmom v skle alebo kašou odpadá jedno jedlo vo fľaši.

**Návod na prípravu**

Dodržujte presne návod na prípravu mléčnej dojčenskej výživy ako aj uvedené odporúčania. Nesprávná príprava alebo uchovanie by mohlo viesť k ohroženiu zdravia Vášho dieťaťa, napr. nárastom nežiaducich bakteriálnych zrodkov. Preto pripravujte výživu pred každým krmným čerstvou. Zvyšky opakovane nepoužívajte. Fľašu a všetky jej súčasti vždy starostlivo vymyte. Otvorený obal ihneď po odobraní výrobku dobre uzavrite, uchováajte v suchu pri teplote max. 25°C a zamezte kolísaniu teplot. Výrobek spotrebujte do 3 týždňov od otvorenia obalu. Neohřívajte výrobek v mikrovlnnej rúre (bezpečnostné opatrenia). Pred použitím sa prosím presvedčte, že balenie ostalo neporušené.

1. Pitnú vodu určenú pre dojčatá pred každou prípravou čerstvo prevaríme a necháme schladnúť na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. Připravenou vodu nalejeme do fľaše (množstvo podľa tabulky).
3. Odmerku zľahka naplníme výrobkom a opačnou stranou noža zarovnáme. Odměřené množství výrobku vložíme do fľaše.
4. Fľašu uzavrieme a dôkladne pretrepejeme.
5. Schladíme na teplotu vhodnú na pitie (cca 37°C). Teplotu preveríme.

**BEBIVITA 2 – Pokračovací mléčná kojenecká výživa od ukončeného 6. měsíce, 500 g**

- **Vitámín C, D<sup>1</sup>** - prispívajú ke správnej funkcii imunitného systému
- **Vitámín D<sup>1</sup>** - prispívá k normálnému rastu kostí a zubov
- **Vitámín B2 a biotín<sup>1</sup>** - podporuje správnu funkciu energetického metabolismu
- **Vitámín K<sup>1</sup>**
- **Jód<sup>1</sup>** - prispívá k správnej funkcii štítnej žľazy
- **Omega -3 mastné kyseliny (kys. alfa-linolenová)** - podporujú vývoj mozku a nervových buniek
- **DHA (kyselina dokosahexaenová)** - do 1.roka prispívá príjem DHA k normálnému vývoju zraku

<sup>1</sup> dle zákona

Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.

**Použití:** Bebevita 2 pokračovací mléčná kojenecká výživa je určena pro zvláštní výživu od ukončeného 6. měsíce.

- v návaznosti na kojení, pokud je Vaše dítě příkrmováno
- v návaznosti na jakoukoliv počáteční mléčnou kojeneckou výživu.

Na Bebevitu 2 můžete přejít z jakékoliv jiné pokračovací mléčné výživy. Skladujte v suchu při pokojové teplotě.

**BEBIVITA 2 – Následná mléčná dojčenská výživa od ukončeného 6. mesiaca, 500 g**

- **Vitámín C, D<sup>1</sup>** - prispievajú k správnej funkcii imunitného systému
- **Vitámín D<sup>1</sup>** - prispievá k normálnemu rastu kostí a zubov
- **Vitámín B2 a biotín<sup>1</sup>** - podporuje správnu funkciu energetického metabolismu
- **Vitámín K<sup>1</sup>**
- **Jód<sup>1</sup>** - prispievá k správnej funkcii štítnej žľazy
- **Omega -3 mastné kyseliny (kys. alfa-linolenová)** - podporujú vývoj mozku a nervových buniek
- **DHA (kyselina dokosahexaenová)** - do 1.roka prispievá príjem DHA k normálnemu vývoju zraku

<sup>1</sup> podľa zákona

Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vášho dieťaťa.

**Použitie:** Bebevita 2 následná mléčná dojčenská výživa je určená na osobitnú výživu dojčiat od ukončeného 6. mesiaca.

- v návaznosti na dočinenie, pokiaľ je Vaše dieťa príkrmované
- v návaznosti na akúkoľvek počiatocnú mléčnú dojčenskú výživu

Na Bebevitu 2 môžete prejsť z akejkoľvek inej následnej mléčnej výživy. Skladujte v suchu pri izbovej teplotě.

Výška plnění je technicky podmíněna. Baleno v ochranné atmosféře. Výška plnění je technicky podmienena. Balené v ochranné atmosféře.

Pokračovací mléčná kojenecká výživa od uk. 6. měsíce v prášku. Číslo výrobního závodu, minimální trvanlivost geotvoreného balení do: viz spodní strana / Následná mléčná dojčenská výživa od uk. 6. mesiaca v prášku. Číslo výrobného závodu, minimálna trvanlivosť neotvoreného balenia do: vid spodná strana



**Hmotnost / Hmotnosť:**  
**e 500 g**

**V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici:** info@bebevita.cz, www.bebivita.cz, Infolinka (po-pá 9 - 14 hod.): +420 724 369 006

**V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii:** info@bebevita.sk, www.bebivita.sk, Infolinka: (po-pia 9-14 hod.): +420 724 369 006

Číslo výrobku: 1117-01 1034EM

HiPP Czech, s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5 Balené: Německo/Nemecko

