

Výživové údaje	100 g	100 ml pripravenej / pripravenej výživy**
Energie / Energia (KJ / kcal)	2054/490	292/70
Tuky (z toho)	22,9 g	3,3 g
- nasýtené / nasýtené mastné kyseliny	7,5 g	1,1 g
- mononenасыtené / mononenасыtené mastné kyseliny	10,5 g	1,5 g
- polyneасыtené / polyneасыtené mastné kyseliny	4,9 g	0,7 g
Sacharidy (z toho)	60,7 g	8,6 g
- cukry <sup>1</sup>	33,3 g	4,7 g
- škrob	11,7 g	1,7 g
Bielkoviny/Bielkoviny	10,3 g	1,5 g
Sól/Sol <sup>2</sup>	0,35 g	0,05 g
Sodík	140 mg	20 mg
Draslík	560 mg	80 mg (8%*)
Chloridy	315 mg	45 mg (9%*)
Vápnik/Vápnik	490 mg	70 mg (13%*)
Fosfor	270 mg	38 mg (7%*)
Horčík/Horčík	49 mg	7 mg (9%*)
Železo	7,2 mg	1,0 mg (13%*)
Zinok/Zinok	4,9 mg	0,7 mg (14%*)
Méd/Med	0,315 mg	0,045 mg (9%*)
Iód	105 µg	15 µg (19%*)
Selen/Selén	12 µg	1,7 µg (9%*)
Mangan/Mangán	0,049 mg	0,0070 mg (1%*)
Fluoridy	0,025 mg	0,0036 mg
Vitámín A	490 µg	70 µg (18%*)
Vitámín D	8,1 µg	1,2 µg (17%*)
Vitámín E	6,7 mg	1,0 mg (20%*)
Vitámín K	35 µg	5 µg (42%*)
Vitámín C	77 mg	11,0 mg (24%*)
Vitámín B1	0,49 mg	0,07 mg (14%*)
Vitámín B2	0,92 mg	0,13 mg (19%*)
Niacin/Niacín	4,2 mg	0,60 mg (9%*)
Vitámín B6	0,42 mg	0,06 mg (9%*)
Kyselina listová	84 µg	12,0 µg (16%*)
Vitámín B12	1,4 µg	0,20 µg (25%*)
Kyselina pantothenová/pantothenová	3,5 mg	0,50 mg (17%*)
Biotín/Biotín	14 µg	2,0 µg (20%*)
<b>Dalšie výživové údaje / Dalšie výživové údaje</b>		
Kyselina linolová (omega-6 mastná kyselina)	4,4 g	0,6 g
Kyselina alfa-linolenová/linolenová (omega-3 mastná kyselina)	0,5 g	0,07 g

\*referenčné hodnoty príjmu / \*referenčné hodnoty príjmu  
<sup>1</sup> z toho 92 % laktóza, <sup>2</sup> prirôznené sa vyskytujúci v surovinách / <sup>2</sup> prirôznené sa vyskytujúci v surovinách

Analytické hodnoty podliehajú výkylvum, ktoré jsou obvyklé u výrobu k prírodných surovin.  
 \*\*Standardní ředění: 14,2 g Bebevita 2 + 90 ml připravené pitné vody = 100 ml pripravenej výživy.  
 1 zarovaná odměrka = 4,7 g Bebevita 2. / Analytické hodnoty podliehajú výkylvum, ktoré jsou obvyklé u výrobu k prírodných surovin. \*\* Standardné riedenie: 14,2 g Bebevita 2 + 90 ml pripravenej pitnej vody = 100 ml pripravenej výživy. 1 zarovaná odměrka = 4,7 g Bebevita 2.

**Složení:** odtučnené mléko, rostlinné oleje (palmový olej, řepkový olej, slunečnicový olej), škrob, produkt **mliečne syrovátky laktóza (z mléka)**, maltodextrín, glukózový sirup, sušená **mliečna syrovátka**, emulgátor **sójový lecitín**, uhličitán vápenatý, draselné soli kyseliny citrónové, citrónan sodný, vápenaté soli kyseliny orthofosforečnej, chlorid draselný, L-askorbát sodný (vitamín C), uhličitán horečnatý, mliečan železnatý, L-tryptofán, oxid zinečnatý, nikotinamid, DL-alpha tokoferyl acetát (vitamín E), D-pantothenát vápenatý, síran mednatý, thiamín hydrochlorid (vitamín B1), retinyl acetát (vitamín A), riboflavin (vitamín B2), pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6), kys.listová, jodičnan draselný, síran manganatý, fytomenadion (vitamín K), seleničitan sodný, D-biotín, cholekalciferol (vitamín D), kyanokobalamin (vitamín B12). Obsahuje pridanou mliečnu bielkovinu, sóju.

**Zloženie:** odtučnené mléko, rastlinné oleje (palmový olej, řepkový olej, slnečnicový olej), škrob, produkt **mliečne srvátky laktóza (z mléka)**, maltodextrín, glukózový sirup, sušená **mliečna srvátka**, emulgátor **sójový lecitín**, uhličitán vápenatý, draselné soli kyseliny citrónovej, citrónan sodný, vápenaté soli kyseliny orthofosforečnej, chlorid draselný, L-askorban sodný (vitamín C), uhličitán horečnatý, mliečan železnatý, L-tryptofán, oxid zinočnatý, nikotinamid, DL-alpha tokoferyl acetát (vitamín E), D-pantothenát vápenatý, síran mednatý, thiamín hydrochlorid (vitamín B1), retinyl acetát (vitamín A), riboflavin (vitamín B2), pyridoxín hydrochlorid (vitamín B6), kys.listová, jodičnan draselný, síran manganatý, fytomenadion (vitamín K), seleničitan sodný, D-biotín, cholekalciferol (vitamín D), kyanokobalamin (vitamín B12). Obsahuje pridanú mliečnu bielkovinu, sóju. Vztahuje sa / Vztahuje sa k sušenému stavu.

**Pokračovací mléčná kojenecká výživa od ukončeného 6. měsíce, 500 g**

**Důležité upozornění:**

...pro výživu Vašeho dítěte - Vylučné kojení je v prvních šesti měsících pro Vaše dítě ideální. Pokračovací mléčná kojenecká výživa není vhodná jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. Pokračovací mléčná kojenecká výživa je určena pro děti od ukončeného 6. měsíce jako součást různorodé stravy. Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimek z pravidla šesti měsíců by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě, v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách konkrétního kojence.

...pro zuby Vašeho dítěte - Stejně jako mateřské mléko, obsahují také kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý nebo trvalý kontakt zubů s tekutinou obsahující sacharidy může způsobit vznik zubního kazu a s tím související zdravotní potíže. Krmte proto své dítě plynule, nenechávejte ho z lžáve dlouho pít a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku.

Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.

**Množství nápoje a dávkování**

Množství nápoje na lžáve může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Uvedená množství nápoje a počty lžávi jsou pouze orientační.

**Používejte prosím příloženou odměrku!**

Množství připravené výživy / Množstvo pripravenej výživy	Na jednu dávku potřebujete / Na jednu dávku potrebujete		
	Množství vody / Množstvo vody	Počet odměrek / Počet odmeriek	Množství prášku / Množstvo prášku
135 ml	120 ml	4	19 g
170 ml	150 ml	5	24 g
200 ml	180 ml	6	28 g
235 ml	210 ml	7	33 g

Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. S každým nově přidaným příkrmem nebo kaší odpadá jedno jídlo v lžávi.

**Návod k přípravě**

Dodržujte přesně návod na přípravu mléčné kojenecké výživy i uvedená doporučení. Nesprávná příprava nebo uchování by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte, např. nárůstem nežádoucích bakteriálních zrodků. Proto připravujte výživu před každým krmním čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. Lžáve a všechny její součásti vždy pečlivě vymyjte. Otevřený obal ihned po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu při teplotě max. 25°C a zamezte kolísání teplot. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otevření obalu. Neohřívajte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření). Před použitím se prosím přesvědčte, že balení zůstalo neporušené.

1. Pitnou vodu určenou pro kojence před každou přípravou čerstvě převaríme a necháme zchladnout na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. 2/3 připravené vody nalijeme do lžáve (množstvo podľa tabulky).
3. Odměrku lehce naplníme výrobkem a opačnou stranou nože zarovnáme. Odměřené množství výrobku přidáme do lžáve.
4. Lžáve uzavřeme a důkladně protřepeme.
5. Přidáme zbytek vody a opět několikrát důkladně protřepeme.
6. Zchladíme na teplotu vhodnou k pití (cca 37°C). Teplotu prověříme.



**Následná mléčná kojenecká výživa od ukončeného 6. měsíce, 500 g**

**Dôležité upozornenia:**

...pre výživu Vášho dieťaťa - Vylučné dočinenie je v prvých šiestich mesiacoch pre Vaše dieťa ideálne. Následná mléčná kojenecká výživa nie je vhodná ako náhrada mateřského mlieka počas prvých šiestich mesiacov života. Následná mléčná kojenecká výživa je určená pre deti od ukončeného 6. mesiaca ako súčasť rôznorodej stravy. Rozhodnutie začať podávať príkrmy, vrátane akejkoľvek výnimky z pravidla šiestich mesiacov, by malo byť prijaté len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa, v závislosti od individuálneho rastu a vývojových potrieb konkrétneho dieťaťa.

...pre zuby Vášho dieťaťa - Tak ako materské mlieko, obsahujú aj dojčenské výživy sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy Vášho dieťaťa. Častý alebo trvalý kontakt zubov s tekutinou obsahujúcou sacharidy, môže spôsobiť vznik zubného kazu a s tým súvisiace zdravotné problémy. Kŕmte preto svoje dieťa bez prerušovania, nenechávajte ho z fľaše dlho piť a naučte ho čo najskôr piť z pohára.

Venujte pozornosť vyváženej strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

**Množstvo nápoja a dávkovanie**

Množstvo nápoja na fľašu môže byť rozdielne na základě individuálních potřeb. Uvedené množství nápoja a počet fľaš na deň sú len orientačné.

**Použíajte prosím príloženú odměrku!**

Dojčatá potrebujú cca 5 jedál denne. S každým novo pridaným príkrmom v skle alebo kašou odpadá jedno jedlo vo fľaši.

**Návod na prípravu**

Dodržujte presne návod na prípravu mliečnej dojčenskej výživy ako aj uvedené odporúčania. Nesprávná príprava alebo uchovávanie by mohlo viesť k ohroženiu zdravia Vášho dieťaťa, napr. nárastom nežádoucích bakteriálnych zrodkov. Preto pripravujte výživu pred každým krmným čerstvú. Zostatky opakovane nepoužíajte. Fľašu a všetky jej súčasti vždy starostlivo vymyte. Otvorený obal ihned po odobraní výrobku dobre uzavřete, uchovávejte v suchu pri teplotě max. 25°C a zamezde kolísaniu teplot. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otvorenia obalu. Nezhrievajte výrobok v mikrovlnnej rúre (nebezpečenie popálenia). Pred použitím sa prosím presvedčte, že balenie ostalo neporušené.

1. Pitnú vodu určenú pre dojčatá pred každou prípravou čerstvo převaríme a necháme schladit na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. 2/3 pripravenej vody nalejeme do fľaše (množstvo podľa tabulky).
3. Odměrku zľahka naplníme výrobkom a opačnou stranou noža zarovnáme. Odměřené množství výrobku vložíme do fľaše.
4. Fľašu uzavřeme a dôkladne pretrepeme.
5. Přidáme zbytek vody a opat niekoľkokrát pretrepeme.
6. Schladíme na teplotu vhodnú na pitie (cca 37°C). Teplotu prověříme.

**BEBIVITA 2 – Pokračovací mléčná kojenecká výživa od ukončeného 6. měsíce, 500 g**

- Vápnik<sup>1</sup> - dôležitý pro vývoj kostí
- Železo<sup>1</sup> - dôležité pro krvetvorbu a pro rozvoj duševních schopností
- Zinek<sup>1</sup> - pro podporu imunitního systému
- Iód<sup>1</sup> - dôležitý pro rozvoj duševních schopností, podporuje funkci štítné žlázy
- Vitamín C<sup>1</sup> - podporuje vlastní obranyschopnost organismu a vstřebávání železa
- Vitamín A<sup>1</sup> - podporuje vlastní obranyschopnost organismu
- Vitamín D<sup>1</sup> - dôležitý pro tvorbu kostí, podporuje vlastní obranyschopnost organismu
- Vitamín E<sup>1</sup>
- Vitamín B2<sup>1</sup> - pro látkovou výměnu
- Vitamín B12<sup>1</sup>, kyselina listová<sup>1</sup>, kyselina pantothenová, biotín<sup>1</sup>
- Bohaté na vitamín K<sup>1</sup>
- Omega-3 mastné kyseliny - dôležité pro vývoj mozku a nervových buniek

<sup>1</sup> dle zákona

Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.

**Použití:** Bebevita 2 pokračovací mléčná kojenecká výživa je určena pro zvláštní výživu od ukončeného 6. měsíce.

- v návaznosti na kojení, pokud je Vaše dítě příkrmováno
  - v návaznosti na jakoukoliv počáteční mléčnou kojeneckou výživu.
- Na Bebevitu 2 můžete přejít z jakékoliv jiné pokračovací mléčné výživy. Skladujte v suchu při pokojové teplotě.

**BEBIVITA 2 – Následná mléčná kojenecká výživa od ukončeného 6. měsíce, 500 g**

- Vápnik<sup>1</sup> - dôležitý pre vývoj kostí
- Železo<sup>1</sup> - dôležité pre krvotvorbu a pre rozvoj duševných schopností
- Zinok<sup>1</sup> - pre podporu imunitného systému
- Iód<sup>1</sup> - dôležitý pre rozvoj duševných schopností, podporuje funkciu štítnej žľazy
- Vitamín C<sup>1</sup> - podporuje vlastnú obranyschopnosť organizmu a vstrebávanie železa
- Vitamín A<sup>1</sup> - podporuje vlastnú obranyschopnosť organizmu
- Vitamín D<sup>1</sup> - dôležitý pre tvorbu kostí, podporuje vlastnú obranyschopnosť organizmu
- Vitamín E<sup>1</sup>
- Vitamín B2<sup>1</sup> - pre látkovú výmenu
- Vitamín B12<sup>1</sup>, kyselina listová<sup>1</sup>, kyselina pantothenová, biotín<sup>1</sup>
- Bohaté na vitamín K<sup>1</sup>
- Omega-3 mastné kyseliny - dôležité pre vývoj mozku a nervových buniek

<sup>1</sup> podľa zákona

Venujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vášho dieťaťa.

**Použitie:** Bebevita 2 následná mléčná kojenecká výživa je určena na osobitnú výživu dojčiat od ukončeného 6. mesiaca.

- v nadvaznosti na dočinenie, pokiaľ je Vaše dieťa príkrmované
  - v nadvaznosti na akúkoľvek počiatocnú mliečnu dojčenskú výživu
- Na Bebevitu 2 môžete prejsť z akejkoľvek inej následnej mliečnej výživy. Skladujte v suchu pri izbovej teplotě.

Výška plnění je technicky podmíněná. Baleno v ochranné atmosféře. Výška plnenia je technicky podmienená. Balené v ochranné atmosfére.

Pokračovací mléčná kojenecká výživa od uk. 6. měsíce v prášku. Číslo výrobního závodu, minimální trvanlivost neotevřeného balení do: viz obal. / Následná mléčná kojenecká výživa od uk. 6. mesiaca v prášku. Číslo výrobného závodu, minimálna trvanlivost neotvoreného balenia do: viď obal.



**Hmotnosť / Hmotnosť: e 500 g**

**V prípade jakýchkoľvek dotazů jsme Vám k dispozici:** info@bebevita.cz, www.bebivita.cz, Infolinka (po-pá 9-15 hod.): +420 724 369 006

**V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii:** info@bebevita.sk, www.bebivita.sk, Infolinka: (po-pia 9-15 hod.): +420 724 369 006

Číslo výrobku: 1117 13\_2542EM

HIPP Czech, s.r.o.,  
 Pečarská 628/14, 155 00 Praha 5  
 Vyrobeno: EU

