

Výživové údaje	100 g	100 ml připravené / pripravené výživy*
Energie / Energia (kJ / kcal)	2054 / 490	292 / 70
Tuky (z toho)	22,9 g	3,3 g
- nasyté mastné kyseliny	7,4 g	1,1 g
- monoenasyté / mononenasýté mastné kyseliny	10,6 g	1,5 g
- polynenasýté / polynenasýté mastné kyseliny	4,9 g	0,7 g
Sacharidy (z toho)	60,5 g	8,6 g
- cukry <sup>1</sup>	31,8 g	4,5 g
- škrob	16,5 g	2,3 g
Bílkoviny/Bielkoviny	10,5 g	1,5 g
Sůl/Sol <sup>2</sup>	0,35 g	0,05 g
Sodič	140 mg	20 mg
Draslík	560 mg	80 mg (8 %*)
Chloridy	315 mg	45 mg (9 %*)
Vápník/Vápník	490 mg	70 mg (13 %*)
Fosfor	270 mg	38 mg (7 %*)
Horčík/Horčík	49 mg	7,0 mg (9 %*)
Železo	6,9 mg	1,0 mg (13 %*)
Zinek/Zinok	4,9 mg	0,7 mg (14 %*)
Měď/Med	0,315 mg	0,045 mg (9 %*)
Jód	105 µg	15 µg (19 %*)
Selen/Selén	12 µg	1,7 µg (9 %*)
Mangan/Mangán	0,049 mg	0,0070 mg (1 %*)
Fluoridy	0,021 mg	0,0030 mg
Vitamin A	490 µg	70 µg (18 %*)
Vitamin D	8,3 µg	1,2 µg (17 %*)
Vitamin E	6,8 mg	1,0 mg (20 %*)
Vitamin K	35 µg	5,0 µg (42 %*)
Vitamin C	79 mg	11,0 mg (24 %*)
Vitamin B1	0,49 mg	0,07 mg (14 %*)
Vitamin B2	0,92 mg	0,13 mg (19 %*)
Niacin/Niacín	4,2 mg	0,60 mg (9 %*)
Vitamin B6	0,43 mg	0,06 mg (9 %*)
Kyselina listová	85 µg	12,0 µg (16 %*)
Vitamin B12	1,4 µg	0,20 µg (25 %*)
Kyselina pantoténová/pantoténová	3,5 mg	0,5 mg (17 %*)
Biotin/Biotín	14 µg	2,0 µg (20 %*)
<b>Další výživové údaje / Ďalšie výživové údaje</b>		
Kyselina linolová (Omega-6 mastná kyselina)	4,4 g	0,6 g
Kyselina alfa-linoléová/línoléová (Omega-3 mastná kyselina)	0,5 g	0,07 g

<sup>1</sup> z toho 92 % laktóza<sup>\*</sup>referenční hodnoty príjmu<sup>2</sup>přirozeně se vyskytující v surovinách

Analytické hodnoty podléhají výkyvům, které jsou obvyklé u výrobků z přírodních surovin. \*\*Standardní řízení: 14,2 g Bebivita 3 + 90 ml připravené pitné vody = 100 ml připravené výživy. 1 zárovnaná odměra = 4,7 g Bebivita 3.

Analytické hodnoty podliehajú výkyvom, ktoré sú obvyklé u výrobkov z prírodných surovin. \*\*Standardné riadenie: 14,2 g Bebivita 3 + 90 ml pripravenej pitnej vody = 100 ml pripravenej výživy. 1 zárovnaná odmēra = 4,7 g Bebivita 3.

## Pokračovací mléčná kojenecká výživa od ukončeného 9. měsíce, 500 g

### Dôležitá upozornění:

...pro výživu Vašeho dítěte - Výlučné kojení je v prvních šesti měsících pro Vaše dítě ideální. Pokračovací mléčná kojenecká výživa není vhodná jako nahradá mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. Pokračovací mléčná kojenecká výživa je určena pro děti od ukončeného 9. měsíce jako součást různorodé stravy. Rozhodnuty o zahájení podávání příkrmu, včetně jakékoli výjimky z pravidla šestich měsíců, by mělo být přijmáno pouze na základě doporučení lekára nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku, v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách konkrétního kojence.

...pro zuby Vašeho dítěte - Stejně jako mateřské mléko, obsahuje také kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy Vašeho dítěte. Častý ale trvalý kontakt zubů s tekutinou obsahující sacharidy může způsobit vznik Zubného kazu a s tím související zdravotní potíže. Krme proto své dítě plnule, nenechávejte ho z lávky dlouho pit a naučte ho co nejdříve pít z hrnečku.

### Množství nápoje a dávkování

Množství nápoje na láhev může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Uvedená množství nápoje a množství mléčné výživy jsou pouze orientační.

### Používejte prosím přiloženou odměru!

Množství připravené výživy / Množstvo pripravenej výživy	Na jednu dávku potřebujete / Na jednu dávku potřebujete		
	Množství vody / Množstvo vody	Počet odměrek / Počet odmírek	Množství prášku / Množstvo prášku
135 ml	120 ml	4	19 g
170 ml	150 ml	5	24 g
200 ml	180 ml	6	28 g
235 ml	210 ml	7	33 g

Kojenci potřebují cca 5 jídel za den. S každým nově přidaným příkrem nebo kaší odpadá jedno jídlo z lávky.

### Návod k přípravě

Dodržujte přesné návod na přípravu mléčné kojenecké výživy i uvedená doporučení. Nesprávná příprava nebo uchovávání by mohlo vést k ohrožení Vašeho dítěte, např. nárustem nežádoucích bakteriálních zárodků. Proto připravujte výživu před každým krmením čerstvou. Zbytky znovu nepoužívejte. Láhev a všechny její součásti vždy pečlivě vymýte. Otvorený obal ihned po odobrání výrobku dobre uzavřete, uchovávejte v suchu při teplotě max. 25°C a zamezte kolísání teploty. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otvorenia obalu. Nezohřívajte výrobek v mikrovlnné rúre (nebezpečenstvo popálenia). Pred použitím sa prosím presvedčte, že balenie ostalo neporušené.

1. Pitnou vodu určenou pro kojenice před každou přípravou čerstvě převaríme a necháme zhladnout na teplotu cca 40 °C až 50 °C.
2. 2/3 připravené vody nalijeme do lávky (množství dle tabulky).
3. Odměru lehce naplníme výrobkem a opačnou stranou nožem zarovnáme. Odměrené množství výrobku přidáme do lávky.
4. Láhev užavřeme a důkladně protřepeme.
5. Přidáme zbytky vody a opět několikrát důkladně protřepeme.
6. Zchládime na teplotu vhodnou k pití (cca 37°C). Teplotu preveríme.



## Následná mliečna dojčenská výživa od ukončeného 9. mesiaca, 500 g

### Dôležité upozornenia:

...pre výživu Vašeho dieťaťa - Výlučné dojčenie je v prvých šiestich mesiacoch pre Vaše dieťa ideálne. Následná mliečna dojčenská výživa nie je vhodná ako nahradá materského mlieka během prvých šiestich mesiacov života. Následná mliečna dojčenská výživa je určená pre deti od ukončeného 9. mesiaca ako súčasť rôznorodej stravy. Rozhodnute začať podávať príkmy, vrátene akejkoľvek výnimky z pravidla šiestich mesiacov, by malo byť prijaté len na základe doporučenia lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku, v závislosti na individuálnych potrebách konkrétného kojenca.

...pre zuby Vašeho dieťaťa - Tak ako materské mlieko, obsahuje aj dojčenské výživy sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy Vašeho dieťaťa. Častý ale trvalý kontakt zubov s tekutinou obsahujúcim sacharidy môže zpôsobiť vznik Zubného kazu a s tým súvisiace zdravotné problémy. Krme proto svoje dieťaťo pred prerozvášaním, nenechávajte ho z fláše dlho piť a naučte ho co najskôr pít z pohára.

### Množstvo nápoja a dávkovanie

Množstvo nápoja na flášu môže byť rozdielné na základe individuálnych potrieb. Uvedené množstvo nápoja a množstvo mliečnej výživy na deň sú len orientačné.

### Používajte prosím priloženú odměru!

- Jód<sup>1</sup> – dôležitý pre rozvoj duševných schopností, podporuje funkciu štítné žľazy
- Vitamín C – podporuje vlastné obranyschopnosť organizmu a vstrebávanie železa
- Vitamín A<sup>1</sup> – podporuje vlastné obranyschopnosť organizmu
- Vitamín D<sup>1</sup> – dôležitý pre tvorbu kostí, podporuje vlastné obranyschopnosť organizmu
- Vitamín E, vitamín B2, vitamín B12, kyselina listová<sup>1</sup>, kyselina pantoténová<sup>1</sup>, biotín<sup>1</sup>
- Bohaté na vitamín K<sup>1</sup>
- Omega-3 mastné kyseliny – dôležité pre vývoj mozku a nervových buniek

Venujte pozornosť vyvážené strave a zdravému zpôsobu života Vašeho dieťaťa.

Venujte pozornosť vyvážené strave a zdravému spôsobu života Vašeho dieťaťa.

Použitie: Bebivita 3 pokračovací mléčná kojenecká výživa je určená pro zvláštnu výživu od ukončeného 9. mesiaca.

- v návaznosti na kojenie, pokud je Vaše dieťaťo pripravované

Na Bebivitu 3 môžete prejsť z jakékoliv inéj pokračovací mléčnej výživy.

Zloženie: odčutnené mlieko, rostlinné oleje (palmovej olej, repkový olej, slnečnicový olej), škrob, produkt mliečnej svärvatky, laktóza (z mlieka), glukózový sirup, maltodextrín, emulgátor sójový lecitín, uhlíčitan vápenatý, draselné soli kyseliny citrónovej, citronan sodný, L-askorbat sodný (vitamin C), chlorid draselný, uhlíčitan hořecnatý, mliečan železatý, L-tryptofán, L-tyrosín, oxid zinečnatý, vápenaté soli kyseliny orthofosforečné, nikotinamid, DL-alfa tokoferyl acetát (vitamin E), D-pantothénat vápenatý, síran mědinatý, thiamin hydrochlorid (vitamin B1), retinyl acetát (vitamin A), riboflavin (vitamin B2), pyridoxin hydrochlorid (vitamin B6), kyselina listová, síran manganiat, jodičnan draselný, fytomenadion (vitamin K), seleničtan sodný, D-biotin, cholekalceriferol (vitamin D), kyanokobalamín (vitamin B12). Obsahuje pridanou mléčnou bílkovinu, sóju. Vzťahuje sa k sušenému stavu. Skladujte v suchu pri pokojove teplote.

Výška plnení je technicky podmienená. Baleno v ochrannej atmosfére. Použitie: Bebivita 3 následná mliečna dojčenská výživa je určená na osobitnú výživu dojčiat od ukončeného 9. mesiaca.

Číslo výrobku: 1123 13\_2543EM

Hipp Czech, s.r.o.,  
Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5  
Vyrobeno: EU

**V prípade jakýchkoľvek dotazov je Vám k dispozícii:** info@bebivita.cz, www.bebivita.cz, Infolinka (po-pá 9 - 15 hod.): +420 724 369 006  
**V prípade akýchkoľvek otázok súme Vám k dispozícii:** info@bebivita.sk, www.bebivita.sk, Infolinka: (po-pia 9-15 hod.): +420 724 369 006

